# Grafoak

Joseba Makazaga

1993-VI-1

# Contents

# Chapter 1

# Sarrera

## 1.1 Grafoa

Grafoa: $G = (X, U)$ non:

X elementu kopuru mugatu bat duen multzoa den, elementu hauek erpinak dira. $|X| = n$ , beraz X multzoan n elementu egongo dira.

U berriz $XxX$ biderkaketa kartesiarraren azpimultzo bat izango da, eta bertako elementuei arku izena emango diegu, ondorioz, arku bat erpin bikote ordenatua izango da. $|U| = m$, beraz grafoak m arku izango ditu.

$X = \{x_1, x_2 \dots x_n\}$

$U = \{a_1, a_2 \dots a_m\}$ non $a_k = (x_i, x_j)$

- Baldin $a_k = (x_i, x_i)$ orduan bigizta dela esango dugu.
- Bi erpinen artean arku bakar bat onartzen duten grafoei 1-grafo deituko diegu, p arku onartuko bagenitu p-grafoekin ariko ginateke.
- Baldin
  1. erpin kopuru mugatua.
  2. arkua bikote ordenatua da

  orduan G grafoa grafo *ORIENTATUA* dela eango dugu.
- Grafoa *EZ ORIENTATUA* denean arkuak batzen dituen bi erpinen ordenak ez du garrantzirik, $(x_i, x_j)$ edo $(x_j, x_i)$ berdinak izango dira guretzat:

$\forall (x_i, x_j) \in U \Longrightarrow (x_j, x_i) \in U$

Kasu honetan $U$ multzoko elementuei *ERTZ* izena emango diegu.

### 1.1.1 Grafoen irudikapena

Grafoa irudi bitartez adierazterakoan erpin bakoitza planuko punto bezala adieraziko dugu, arkua berriz, berau osatzen duten bi erpinei dagozkien puntuak batzen dituen segmentu orientatua bezala irudikatuko dugu.

adibidez:

$G = (X, U)$ non $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ eta $U = \{(x_1, x_2), (x_1, x_3)\}$




Grafoa ez orientatua edo ez zuzendua denean ertza irudikatzerakoan bi erpinen arteko segmentu ez orientatua jarriko dugu. adibidez:

$G = (X, U)$ non $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ eta $U = \{(x_1, x_2), (x_1, x_3), (x_2, x_1), (x_3, x_1)\}$




### 1.1.2 Bergeren adierazpidea

$G = (X, \Gamma)$

Gure adierazpidean bezala $X$ erpinen multzoa da, Baina Bergek arkoen multzoa adierazi beharrean korrespondentzia bat erabiltzen du grafoen definizioan:

$\Gamma : X \rightarrow X$ Hau korrespondentzia ez unibokoa da.

non $\Gamma(x_i) = \{x_j \in X/(x_i, x_j) \in U\}$ $x_i$ bakoitzari bere segidakoen multzoa.
Era berean grafo bat honela adierazi daiteke:
$G = (X, \Gamma^{-1})$
Aurrekoan bezala $X$ erpinen multzoa da, eta $\Gamma^{-1} : X \to X$ korrespondentzia ez unibokoa non:
$\Gamma^{-1}(x_i) = \{x_j \in X/(x_j, x_i) \in U\}$ $x_i$ bakoitzari bere aurrekariak.

### 1.1.3 Adierazpide zehatzagoa

$G = (X, U, \Gamma)$
Aurreko adierazpidetan bezala, hemen ere $X$ erpinen multzoa da, $U = \{a_1, a_2 \ldots x_m\}$ arkuen multzoa eta $\Gamma : U \to XxX$ aplikazioak arku bakoitzari erpin bikote ordenatua egokitzen dio:
$\Gamma(a_i) = (x_j, x_k)$

## 1.2 Auzokidetza

- Bi arkuren arteko auzokidetza:

  $a_k$ eta $a_l$ arkuek erpin amankomun bat dutenean auzokideak direla esango dugu.

- Bi erpinen arteko auzokidetza:

  $x_i$ eta $x_j$ erpinen artean arku bat baldin badago bi erpin horiek auzokideak direla esango dugu.

## 1.3 Inzidentzia

- $a$ arkua $x_i$ erpinera inzidentea da baldin $\exists x_j/a = (x_j, x_i)$
- $a$ arkua $x_i$ erpinetik inzidentea da baldin $\exists x_j/a = (x_i, x_j)$
- $a$ *ertza* $x_i$ erpinarekin inzidentea da baldin $\exists x_j/a = (x_i, x_j)$

## 1.4 Erpin baten graduerdiak eta gradua

### 1.4.1 Graduerdiak

Erpinengan bi graduerdi definitzen ditugu:

- $d^+(x_i)$: $x_i$ erpinetik inzidente den arku kopurua ($x_i$tik irteten den arku kopurua).
- $d^-(x_i)$: $x_i$ erpinera inzidente den arku kopurua ($x_i$ra iristen den arku kopurua).

### 1.4.2 Gradua

Erpin baten gradua bere bi graduerdien batura bezala definituko dugu.
$d(x_i) = d^+(x_i) + d^-(x_i)$

- Bergeren adierazpidea kontutan hartuta:

  $d^+(x_i) = |\Gamma(x_i)|$

  $d^-(x_i) = |\Gamma^{-1}(x_i)|$

- Grafo ez zuzenduetan:

  $d^+(x_i) = d^{-(x_i)} = d(x_i)$

- Erpin isolatua 0 gradua duen erpina da.
- Zintzilik dagoen erpina 1 gradua duen erpina da.
- Grafo batetan gradu txikiena duen erpinak grafoaren gradu minimoa adierazten digu: $\min d(G)$
- Grafo batetan gradu handiena duen erpinak grafoaren gradu maximoa adierazten digu: $\max d(G)$.
- Grafo batetan erpin guztiek $k$ gradua badaukate ( $\max d(G) = \min d(G) = k$ ) grafo hori grafo K-erregularra dela esango dugu.
- 1-TEOREMA:

  Erpin guztien graduen batuketa arku kopuruaren bikoitza da.

$$\sum_{x_i \in X} d(x_i) = 2m$$

- 2-TEOREMA:

  gradu bakoitia duten erpin kopurua bikoitia da.

## 1.5 Ibilbideak

Ibilbideak $\mu$ hizkiz adieraziko ditugu, eta honako ibilbide motak bereiziko ditugu, grafo zuzenduak eta ez zuzenduak bereituz:

Grafo ez zuzenduetan:

- $x_i$ eta $x_j$ arteko *ertz sekuentzia*: $x_i$tik $x_j$ra joateko igaro behar den ertz auzokide multzo mugatua da, ez dute ezberdinak izan beharrik.

  Baldin $x_i \neq x_j$ orduan ertz sekuentzia irekia izango da.

  Baldin $x_i = x_j$ orduan ertz sekuentzia itxia izango da.

- *Katea*: Ertz ezberdinez osatutako sekuentziari katea deituko diogu. Itxia bada *zirkuito* izenez adieraziko dugu.

- *Kate edo zirkuito bakuna*:

  Kateak igarotzen dituen erpinak behin bakarrik igarotzen baditu orduan kate bakuna dela esango dugu. Zirkuitoaren kasuan lehenengo eta azkenengo erpina bera da, beste guztiak ezberdinak izango dira.

Grafo zuzenduetan:

- *Arku sekuentzia*: $x_i$tik $x_j$ra joateko igaro behar de arku auzokide multzo mugatua. Hau irekia edo itxia izan daiteke.

- *Bidea*: Arku ezberdinez osatutako arku sekuentzia, hau da, arku bakoitza behin bakarrik ager daiteke sekuentzian. Arku sekuentzia itxia denean *zikloa* izenez adieraziko dugu.

- *Bide edo ziklo bakuna*: Bideak igarotzen dituen erpinak behin bakarrik igarotzen baditu bakuna dela esango dugu.

Ibilbide guzti hauei *kardinalitate* bat lotuko diegu, eta honen balioa sekuentzia osatzen duten arku edo ertz kopurua izango da. P kardinalitatea duten ziklo eta zirkuitoei p-ziklo eta p-zirkuito deituko diegu.

Ibilbideak bi eratara adierazi daitezke:

1. Arkuen sesekuentzia adieraziz, hau da, arkuak etiketatuz.

2. Erpinen sekuentzia adieraziz.

## 1.6 Grafo motak

- Dejeneratua: Arkorik gabeko grafoa, baina erpinak badituena.

  $|X| \neq \emptyset$

  $|U| = \emptyset$

- Osotua: $K_n$: Erpin bakoitza beste guztien auzokide denean.

- Bialdeduna: Grafoaren erpinen artean $X = X_1 \bigcup X_2 / X_1 \bigcap X_2 = \emptyset$ partizioa egin badezakegu eta arku edo ertz guztiek erpin bat alde batean eta bestea bestean badituzte, orduan grafo bialdeduna dela esango dugu.

  – Bialdedun osotua: $K_{n_1,n_2}$ $X_1$eko epin guztiak $X_2$ko erpin guztien auzokide direnean.

    $K_{n_1,n_2}$ non $|X_1| = n_1$ eta $|X_2| = n_2$

## 1.7 Manipulazioak grafoekin

- Erpin bat kendu, $G - x_i = (X^*, U^*)/X^* = X - \{x_i\}$ eta $U^* = U \bigcap (X^* x X^*)$

  Grafotik $x_i$ erpina kendu eta bertara edo bertatik inziditzen duten arkuak kenduta lortzen dugun grafoa izango da $G - x_i$

- Arku bat kendu, $G - a = (X, U^*)/U^* = U - \{a\}$

  Grafotik arku hori kendu, baina beste guztia berdin mantendu.

- Arkua kontraitu, $G \backslash a$, non $a = (x_1, x_2)$. Honi kontrakzio elementala deituko diogu eta $x_1$ eta $x_2$ erpinak kenduz, eta bi hauen ordez bakar bat jarriaz lortzen da, baina berri honek aurreko bien auzokideen auzokide izan behar du.

  $G_1$ grafoa $G_2$ grafora kontraigarria dela esango dugu baldin eta $G_1$etik hasi eta kontrakzio elementalak eginaz $G_2$ lortu badezakegu.

- Erpin partizio batek induzitutako kondentsazioa.

$$\mathcal{X} = \{X_1, X_2, \ldots X_p\} / \forall r \neq s \left\{ \begin{array}{l} X_r \bigcap X_s = \emptyset \\ \bigcup_{i=1}^{p} X_i = X \end{array} \right.$$

Horrela $G_{\mathcal{X}} = (\mathcal{X}, U_{\mathcal{X}})$ non

$U_{\mathcal{X}} = \{(X_r, X_s) \in \mathcal{X}x\mathcal{X} / X_r \neq X_s \wedge \exists x_i \in X_r, x_j \in X_s / (x_i, x_j) \in U\}$

## 1.8 Grafoen arteko erlazioak

- Grafo partziala: $G_p = (X, U_p)$ non $U_p \subset U$

  Erpin berdinak baina arku gutxiago dituen grafoa.

- Azpigrafoa: $G_b \subset G$, $G_b = (X_b, U_b)$ non $X_b \subset X \wedge U_b = U \bigcap (X_b x X_b)$

  Erpin gutxiago dituen grafoa baina gelditzen diren erpinen artean haseræko grafoan zeuden arku guztiak mantentzen dituena.

  $G_b$ grafoa $G$ grafoaren azpigrafoa bada $G$ grafoa $G_b$ grafoaren supergrafoa dela esango dugu: $G \supset G_b$

- Grafo sinplifikatua: $G_s = (X, U_s)$ non:

  $U_s = \{(x_i, x_j) / (x_i, x_j) \in U \vee (x_j, x_I) \in U\}$

  Grafo sinplifikatua bigiztarik gabekoa eta arkuak dauden lekuan ertzak jarriaz lortzen dugun grafoa da, beraz grafo ez zuzendua izango da.

- Grafo osagarria: $\overline{G} = (X, \overline{U})$ non:

  $\overline{U} = \{(x_i, x_j) / (x_i, x_j) \notin U\}$

- Isomorfia: $G_1 \equiv G_2$ $G_1 = (X_1, U_1)$ eta $G_2 = (X_2, U_2)$

  $X_1$ eta $X_2$ko erpinen artean auzokidetza mantentzen duen korrespondentzi biunibokoa baldin badago orduan bi grafoak isomorfoak direla esango dugu.

  Beste era batetara esanda, $G_1$ko $x_i$ren auzokideei dagozkien $G_2$ko erpin guztiak $x_i$ri dagokion $G_2$ko erpinaren auzokide izan behar dute, eta hori erpin guztiekin bete behar da.

  Erlazio hau baliokidetasun erlazioa da: erreflexiboa, simetrikoa eta iragankorra da.

  Isomorfia erlazioa zehatz mehatz adierazi beharko bagenu goiko definizioak ez liguke balioko, ez bait da behar adinako zehatza p-grafoen kasurako. Zehaztasuna nahi izanez gero grafoen hirugarren adierazpidera jo behar dugu eta isomorfia honela definituko genuke:

Izan bitez $G = (X, U, \Gamma)$ eta $G^* = (X^*, U^*, \Gamma^*)$. $G$ eta$G^*$ isomorfoak badira orduan

$$\begin{array}{l} \exists \Psi : X \to X^* \\ \exists \Upsilon : U \to U^* \end{array} \Big/ \quad \forall a \in A \quad \Gamma(a) = (x_i, x_j) \Rightarrow \Gamma^*(\Upsilon(a)) = (\Psi(x_i), \Psi(x_j))$$

- Homeomorfia:

  $G_1$ eta $G_2$ homeomorfoak direla esateko biak G grafo batetatik hasi eta bere ertzetan 2 graduko erpinak tartekatuz lortzeko modukoak izan behar dute.

  2 graduko erpinak izan ezik $G_1$ eta $G_2$ isomorfoak dira.

- Grafo minimal/maximala (p propietatearekiko):

  $G$ grafoa p propietatearekiko *minimala* dela esateko honako hauek bete behar dira:

  1. $G$ grafoak p propietatea betetzen du
  2. $\forall G^* G^* \subset G$ orduan $G^*$ grafoak ez du p betetzen

  $G$ grafoa p propietatearekiko *maximala* dela esateko honako hauek bete behar dira:

  1. $G$ grafoak p propietatea betetzen du
  2. $\forall G^*\ G \subset G^*$ orduan $G^*$ grafoak ez du p betetzen

## 1.9 Pisudun grafoa

$G$ grafoko $(x_i, x_j)$ arku bakoitzak $a_{ij}$ pisua (luzera,kapazitatea,balioa) elkartuta badarama, orduan $G$ pisudun grafoa dela esango dugu.

$G$ grafoko ibilbideei luzera bat elkartu diezaiekegu:

$$l(\mu) = \sum_{(x_i, x_j) \in U} a_{ij}$$

## 1.10 Grafo bati loturiko matrizeak

### 1.10.1 Auzokidetza matrizea

$G = (X, U)$ grafoari dagokion auzokidetza matrizea $n\,x\,n$ dimentsioetako honako hau izango da:

$$A = [a_{ij}] \begin{cases} a_{ij} = 1 & (x_i, x_j) \in U \\ a_{ij} = 0 & \text{beste kasuetan} \end{cases}$$

Matrize honen lerro eta zutabeek zenbait berezitasun dituzte:

- Lerroan dagoen 1 kopuruak $d^+(x_i)$ adierazten du:

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} = d^+(x_i)$$

- Zutabean dagoen 1 kopuruak $d^-(x_i)$ adierazten du:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij} = d^-(x_j)$$

- $i$ lerroan 1 daukaten zutabeek adierazten duten erpin multzoa $\Gamma(x_i)$ da.
- $i$ zutabean 1 daukaten lerroek adierazten duten erpin multzoa $\Gamma^{-1}(x_i)$ da.
- Grafoa ez zuzendua bada orduan $a_{ij} = a_{ji}$. Beraz matrizea simetrikoa izango da.

**3. teorema**

Auzokidetza matrizearen potentziak: $A^p = A\,x\,A\,x \ldots x\,A$.

$A^p = [a^p_{ij}]$ Matrizea $n\,x\,n$ dimentsiotakoa da eta bertako $a^p_{ij}$ bakoitzak $x_i$ eta $x_j$ erpinen artean p kardinalitatea duten arku segida ezberdin kopurua adierazten du.

Hau errez ikusten da $A^2$ matrizean:

$A^2 = A\,x\,A = [a^2_{ij}]$ non

$$a^2_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}a_{kj} = \sum_{k=1}^{n} b_k$$

$$b_k \neq 0 \leftrightarrow \begin{cases} a_{ik} \neq 0 \\ a_{kj} \neq 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} (x_i, x_k) \in U \\ (x_k, x_j) \in U \end{cases} \leftrightarrow$$

$x_i$tik $x_j$ra garamatzan 2 kardinalitatea duen arku sekuentzia dago $x_k$ erpinetik pasatzen dena.

Beraz $\sum_{k=1}^{n} b_k$ expresioak bi kardinalitatea duten arku sekuentzia kopurua adierazten du: $a_{ij}^2 = x_i$ eta $x_j$ artean 2 kardinalitatea duten arku segida kopurua izango da.

### 1.10.2 Inzidentzi matrizea

Inzidentzi matrizea $n\,x\,m$ dimentsiodun matrizea izango da:

$$B = [b_{ij}] \begin{cases} b_{ij} = 1 & a_j \text{ arkuaren haserako erpina } x_i \text{ da.} \\ b_{ij} = -1 & a_j \text{ arkuaren bukaerako erpina } x_i \text{ da.} \\ b_{ij} = 0 & \text{beste kasuetan} \end{cases}$$

Matrize honetan zenbait gauza ikus daiteke:

- Zutabe bakoitzak 1 eta $-1$ ditu.
- 0 besterik ez duen lerroa erpin isolatuari dagokio.
- Lerro batek daukan 1 kopurua lerroa dagokion erpinaren $d^+(x_i)$ da.
- Lerro batek daukan $-1$ kopurua lerroa dagokion erpinaren $d^-(x_i)$ da.
- Lerroak edo zutabeak aldatu arren $B$ matrizeak adierazten duen grafoa ez da aldatzen.

## 1.11 Ariketak

1. Grafoa bere osagarriaren isomorfoa denenan autoosagarria dela esaten da.

    - Lau erpin dituen grafo autoosagarria marraztu
    - Bost erpinekoa marraztu.
    - Seikorik ba al dago?
    - Grafo autoosagarrien erpin kopurua $4k$ rdo $4k+1$ dela frogatu

2. Frogatu grafoa bipartitua dela baldin eta soilik baldin bertako zirkuito guztiak kardinalitate bikoitia badute.

3. (93-ira-1.5) Zazpi erpineko 4-erregularra diren bi grafo besterik ez dagoela frogatu.

4. (93-ira-1)Izan bitez $a$ eta $b$ bi zenbaki oso eta positibo, $n = a + b$ eta $a$ zenbaki bikoitia izanik. Frogatu beti existitu daitekela $n$ erpindun grafoa zeinak $a$ erpin gradu bakoitidun eta $b$ erpin gradu bikoitidun dituen.

5. (94-otsa-1) Zazpi erpineko, bigiztarik gabeko eta isomorfo ez diren hiru grafo marraztu, baina hiruretan gradu bereko erpin kopuru bera jarri.

6. (94-otsa-1) Grafo bateko erpinen graduen batuketa grafoko ertz kopuruaren bikoitza dela frogatu.

7. (94-ek-2)Izan bedi $G = (X, U)$ grafo autoosagarria, non $n = 4k + 1$. Frogatu grafoan $(n-1)/2$ graduko erpin bat badagoela gutxienez. (Aholku bezala, gradu horretako erpin kopurua zenbaki bakoitia dela frogatuz saia zaitezkete).

8. (94-ira-1) Bigiztarik gabeko grafo autoduala marraztu baina $k_4$ ez dena.

9. (94-ira-2) Ondorengo bi frogapenak egin.

    - Frogatu grafoa bipartitua dela baldin eta soilik baldin bertako zirkuito guztiak kardinalitate bikoitia badute.
    - $G$ grafoak $n^2/4$ erpin dituela kontutan hartuta, frogatu grafoan kardinalitate bakoitiko zirkuitoak daudela ala grafoa $k_{n/2,n/2}$ dela.